

Imię i nazwisko pacjenta:.....

PESEL:.....

INFORMACJA DLA PACJENTA KIEROWANEGO DO WSZCZEPIENIA DOSTĘPU NACZYNIOWEGO TYPU „PORT” WRAZ Z WYRAŻENIEM ZGODY NA ZABIEG

Dostęp naczyniowy typu „port” jest wszczepianym pod skórę układem, który przez długi czas może służyć do podawania infuzji leków lub do transfuzji lub pobierania krwi. W skład układu wchodzi cewnik wszczepiany do żyły połączony z tzw. komorą portu, czyli miejscem, gdzie wkłuwana się specjalną igłą i podaje leki.

Porty dostępu naczyniowego stosuje się najczęściej w celu chemioterapii dożylną, antybiotykoterapii przewlekłej, dożylnego żywienia pozajelitowego, leczenia bólu, przetaczania krwi lub preparatów krwiopochodnych i wszystkich sytuacji, w których konieczne jest przewlekłe podawanie leków drogą dożylną.

Służą głównie temu, aby wyeliminować przykre dla Państwa i często trudne nakłuwanie żył przed kolejnymi zabiegami a także zapobiegają drażniącemu i niszczącemu żyły działaniu silnie działających leków stosowanych w onkologii.

Wszczepienie portu naczyniowego jest niedużym zabiegiem chirurgicznym, wykonywanym zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym. Polega on na nacięciu skóry w okolicy obojczyka i wprowadzeniu do dużej żyły jak najbardziej serca cewnika przez żyłę odsłoniętą w miejscu nacięcia. Następnie cewnik łączy się ze specjalną komorą, którą wszczepia się tuż pod skórę w okolicy podobojczykowej. Komora portu pokryta jest specjalną membraną silikonową, którą można nakłuć specjalnie wyprofilowaną igłą i w ten sposób uzyskać łatwy dostęp do naczynia.

Po zabiegu wszczepienia portu naczyniowego można chodzić a na drugi dzień chory może być wypisany ze szpitala. Po usunięciu szwów pooperacyjnych i po wygojeniu rany można rozpocząć korzystanie z portu.

Procedura wszczepienia portu jest na ogół niewielkim i prostym zabiegiem, niemniej w rzadkich przypadkach mogą wystąpić powikłania takie jak: przemieszczenie, uszkodzenie lub odłączenie cewnika, krwawienie do kieszonki, w której znajduje się komora portu, zakażenie rany pooperacyjnej, uszkodzenie sąsiadujących narządów – nerwów, naczyń, opłucnej, nieprzewidziane reakcje nadwrażliwości na stosowane przy zabiegu środki.

W razie wystąpienia powyższych powikłań stosuje się specjalne metody lecznicze i pobyt chorego w szpitalu może przedłużyć się o kilka dni.

Portu naczyniowego można używać przez wiele lat, jednak warunkiem jego dobrego funkcjonowania jest odpowiednio częste jego przepłukiwanie oraz zachowywanie zasad higieny przy jego obsłudze. Dlatego konieczne jest, aby wszystkie czynności medyczne przy porcie wykonywały osoby odpowiednio wyszkolone w jego obsłudze.

Przy wypisie ze szpitala otrzymacie Państwo specjalną legitymację, którą należy mieć przy sobie przy każdych czynnościach związanych z portem a także instrukcję z zasadami obsługi portu.

Decyzja pacjenta po rozmowie wyjaśniającej z lekarzem

Pan/Pani dr.....przeprowadził(a) ze mną rozmowę wyjaśniającą dotyczącą wszczepienia portu naczyniowego, w czasie której mogłem(am) uzyskać wszystkie interesujące mnie informacje.

Wyrażam zgodę na wykonanie proponowanego mi zabiegu. Informację przeczytałem(am) osobiście i zrozumiałe dla mnie są mogące wystąpić powikłania i działania uboczne.

Data.....

Podpis pacjenta.....

Podpis lekarza.....

W przypadku braku zgody pacjenta na wszczepienie portu naczyniowego:

Nie wyrażam zgody na wykonanie proponowanego mi zabiegu.

Data.....

Podpis pacjenta.....

Podpis lekarza.....